

Stress in gravidanza? I maschi vi sopravvivono meno

Data: Invalid Date | Autore: Annachiara Cagnazzo



CILE, 18 DICEMBRE 2011 –Se durante i primi mesi di **gravidanza** la donna si trova ad affrontare delle gravi situazioni di stress, allora queste aumentano fortemente i **rischi per un parto prematuro**, che porta alla **morte più i maschi** rispetto alle femmine. È quanto rivelato da un'indagine condotta in Cile durante il terremoto del 2005.[MORE]

In quell'anno il Paese sudamericano ha subito un violentissimo sisma che raggiunse quasi l'**8° grado della scala Richter**. I ricercatori hanno quindi seguito le gravidanze e le eventuali complicazioni fino al parto su un campione molto vasto di donne cilene che in quel periodo erano in stato interessante. Si è arrivati alla conclusione che quelle che avevano subito lo stress del terremoto tra il **secondo e il terzo mese di gravidanza** avevano aumentato del 32% il rischio di un parto pre-termine.

Ma non solo. È stato inoltre rilevato che statisticamente i **bambini maschi sopravvivono assai meno rispetto alle femmine** a questo tipo di natalità. Questi i risultati pubblicati sulla rivista **Human Reproduction**, che hanno permesso di analizzare non solo l'incidenza dello stress nei parti prematuri, ma anche come questo possa influenzare la percentuale di nascite di maschi e femmine. Ovviamente questi sono dati relativi a un tipo di stress molto particolare, come hanno tenuto a precisare gli autori della ricerca.

Annachiara Cagnazzo

